

## PROTOKÓŁ ZASTOSOWANIA MOLNUPIRAVIRU

Warunkiem formalnym, niezbędnym do rozpoczęcia leczenia jest **uzyskanie od pacjenta świadomej zgody na piśmie**.

Konieczne jest udokumentowanie rozpoczęcia leczenia **wpisem do historii choroby w NCM** zawierającym informacje o: **poinformowaniu o działaniu leku, uzyskaniu zgody pacjenta, spełnieniu kryteriów włączenia, ilości wydanego leku** (z odnotowaniem w zakładce leczenie farmakologiczne – dawki i okresu terapii).

Widoczne zamówienia leku w SDS należy przyjąć i zinwentaryzować, dokumentację ich dystrybucji zamieścić w historii choroby w NCM.

---

### Kryteria zastosowania leku

- Zakażenie Sars-Cov-2 potwierdzone testem diagnostycznym;
- Leczenie ambulatoryjne;
- Łagodny i umiarkowany przebieg Covid-19 u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka ciężkiego przebiegu choroby (SNN, HD, DO), stan kliniczny nie wymagający stosowania tlenoterapii;
- Wczesna faza zakażenia - do 5 dni od wystąpienia objawów.

---

### Postać i dawkowanie

- Nazwa handlowa: **Lagevrio**
- Tabletki a 200mg;
- Dawkowanie 2 x 4 tabletki p.o. co 12 godzin = 2 x 800 mg p.o. przez 5 dni;
- Zalecane jest podanie leku po HD lub 2 godziny po wpuszczeniu płynu dializacyjnego (DO);
- U osób dializowanych nie jest wymagana redukcja dawki;
- Nie zaleca się stosowania molnupirawiru w ciąży, u kobiet w wieku rozrodczym należy stosować skuteczną antykoncepcję w czasie trwania leczenia i 4 dni po zakończeniu terapii;
- Nie są wymagane specjalne warunki przechowywania leku.

---

### Możliwe działania niepożądane (częstość występowania 1÷2%):

- Zawroty i bóle głowy;
  - Nudności, biegunka i wymioty;
  - Pokrzywka i rumień skórny.
-