



Minister Zdrowia

Warszawa, 21 lipca 2022

ZPŚ.641.257.2022.JK

**Komunikat nr 26 Ministra Zdrowia
w sprawie podawania dawek przypominających przeciw COVID-19
w Narodowym Programie Szczepień.**

Minister Zdrowia mając na uwadze zalecenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 18 lipca 2022 r. przygotowane w oparciu o stanowisko ekspertów Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejskiej Agencji Leków (EMA) ds. szczepień przeciw COVID-19 (Emergency Task Force - ETF) z dnia 11 lipca 2022 r., informuje, że od dnia 22 lipca 2022 r. rozpocznie się proces szczepień **drugą dawką przypominającą** u osób, które ukończyły 60 lat oraz osób, które ukończyły 12 lat i mają wskazania do szczepienia w związku z zaburzeniami odporności¹.

Drugą dawkę przypominającą szczepienia mogą przyjąć osoby, które otrzymały pierwszą dawkę przypominającą.

Przed podaniem drugiej dawki przypominającej należy zachować odstęp co najmniej 4. miesiące od podania pierwszej dawki przypominającej.

W pierwszej kolejności szczepienia powinny dotyczyć osób, u których od podania pierwszej dawki przypominającej minęło więcej niż 6 miesięcy.

W drugim szczepieniu przypominającym stosowane są wyłącznie **szczepionki mRNA**:

- **Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w pełnej dawce (0,3 ml)**
- **Spikevax (Moderna) w połowie dawki (50 µg - 0,25 ml).**

Do podania drugiej dawki przypominającej zaleca się ten sam preparat mRNA

¹ zgodnie z Komunikatem nr 11 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką dodatkową (stosowaną po pełnym schemacie szczepienia) <https://www.gov.pl/web/zdrowie/Komunikat-w-sprawie-szczepien-przeciw-COVID-19-dawka-dodatkowa>

Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Moderna), którym zrealizowano pierwszą dawkę przypominającą.

UWAGA! Jednocześnie ulega skróceniu z 5 miesięcy do 3 miesięcy dotychczas wymagany minimalny odstęp podania pierwszej dawki przypominającej od zakończenia podstawowego schematu szczepienia.

Informacje dodatkowe:

- na etapie wprowadzania danych do karty szczepień należy bezwzględnie przestrzegać zachowania procedury dla skierowań wystawionych dla dawki przypominającej,
- przed podaniem kolejnej dawki szczepionki (2/przypominająca) należy bezwzględnie potwierdzić aktualny stan zaszczepienia pacjenta,
- niezależnie od preparatu, który użyto do pierwszego szczepienia przypominającego, należy podać dawkę szczepionki mRNA (Comirnaty lub Spikevax) co najmniej 4 miesiące od ostatniego szczepienia,
- nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na dotychczasowe szczepienie,
- przy ocenie stanu układu odporności pacjenta należy uwzględnić stopień ciężkości choroby, czas jej trwania, stan kliniczny pacjenta, powikłania, choroby współistniejące oraz każdą potencjalnie immunosupresyjną terapię,
- dawkę szczepionki należy podać co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem lub wznowieniem leczenia immunosupresyjnego, przy czym termin wykonania szczepienia przeciwko COVID-19 powinien uwzględniać aktualne lub planowane leczenie immunosupresyjne, a także optymalizację zarówno stanu klinicznego pacjenta, jak i odpowiedzi na szczepionkę,
- dawkę szczepionki należy podać co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem lub wznowieniem leczenia immunosupresyjnego, przy czym termin wykonania szczepienia przeciwko COVID-19 powinien uwzględniać aktualne lub planowane leczenie immunosupresyjne, a także optymalizację zarówno stanu klinicznego pacjenta, jak i odpowiedzi na szczepionkę,
- osoby w stanie immunosupresji, również te, które otrzymały łącznie 4 dawki szczepionki mRNA przeciwko COVID-19, należy poinformować o ryzyku słabszej odpowiedzi immunologicznej na szczepienie, a tym samym konieczności dalszego przestrzegania obowiązujących zasad ochrony przed COVID-19. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony pacjentom w stanie immunosupresji, szczepienie przeciw COVID-19 należy rekomendować osobom z ich bliskiego otoczenia (strategia kokonowa),

- skierowanie na szczepienie przy spełnieniu warunku kryterium kwalifikacji z zachowaniem odstępu (minimum 120 dni) dla przyjęcia drugiej dawki przypominającej mRNA będą wystawione automatycznie przez system,
- w przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania na podanie drugiej dawki przypominającej lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym oceniając: wiek pacjenta (60+), odstęp od ostatniego szczepienia (minimum 120 dni), przynależność do grupy ryzyka (osoby ze wskazanymi zaburzeniami odporności).

Z poważaniem

/dokument podpisany elektronicznie/

DRUGA DAWKA PRZYPOMINAJĄCA (2/przypominająca)				
Ukończony cykl szczepienia – wykonanie szczepienia przypominającego (P)	Dopuszczone preparaty	Preferowany preparat	odstęp w dniach	nazwa dawki/numer podawanej dawki
Pfizer (1/P)	Pfizer, Moderna 1/2	Pfizer	120	2/przypominająca
Moderna (1/P)	Moderna 1/2 dawki, Pfizer	Moderna 1/2 dawki	120	2/przypominająca
Novavax (1/P)	Pfizer, Moderna 1/2	Pfizer, Moderna 1/2	120	2/przypominająca
JJ (1/P)	Pfizer, Moderna 1/2	Pfizer, Moderna 1/2	120	2/przypominająca

PIERWSZA DAWKA PRZYPOMINAJĄCA				
Ukończony cykl szczepienia	Dopuszczone preparaty	Preferowany preparat	odstęp w dniach	nazwa dawki
Novavax (2/2)	Novavax, Pfizer, Moderna 1/2, JJ	Novavax	90	Przypominająca
Pfizer (2/2)	Pfizer, Moderna 1/2, JJ, Novavax	Pfizer	90	Przypominająca
Moderna (2/2)	Moderna 1/2 dawki, Pfizer, JJ, Novavax	Moderna 1/2 dawki	90	Przypominająca
AZ (2/2)	Pfizer, Moderna 1/2 dawki, Novavax	Pfizer, Moderna 1/2 dawki, Novavax	90	Przypominająca
JJ (1/1)	Pfizer, Moderna 1/2 dawki, JJ, Novavax	Pfizer, Moderna 1/2 dawki, JJ, Novavax	60	Przypominająca

z upoważnienia Ministra Zdrowia Maciej Miłkowski