



Badanie przetoki dializacyjnej

1. Zapytaj pacjenta, jak ocenia ocenę funkcjonowanie przetoki przed dializą.
2. Zobacz – oceń wzrokowo skórę, zabarwienie, obecność zaczerwienienia, zasinień, czarnych strupów, uszkodzeń, obrzęków, surowiczej czy ropnej wydzieliny.



3. Poczuj – oceń ciepłotę skóry, napięcie i wypełnienie naczyń, twardość naczyń; zapytaj o odczucia pacjenta w czasie badania – bolesność, sprawdź, czy wyczuwalne jest rytmiczne „drżenie” przepływającej krwi.



4. W razie wątpliwości osłuchaj przetokę – zwracając szczególną uwagę na prawidłowy „szmer”.




5. W uzasadnionych przypadkach wykonaj test uniesienia ramienia.



Rys. A

Prawidłowo
– naczynie
na przedramieniu
po uniesieniu
powyżej linii serca
„zapada się”
(Rys. B).

Rys. B



Istotnym elementem w opiece nad przetoką dializacyjną jest edukacja pacjenta w zakresie samobadania przetoki i wczesne reagowanie w razie niepokojących objawów, takich jak: obrzęk, zaczerwienienie, brak wyczuwalnego „drżenia/szmeru”, nadmierne ciepłota, bolesność kończyny z przetoką.